

КАЛЕНДАР
ЩЕПЛЕНЬ

Вакцинація
та пасивна імунізація

Sprache: Ukrainisch

ВАКЦИНАЦІЯ ВІК

Вакцинація та пасивна імунізація мають бути проведені якомога раніше.
Доцільно перевіряти статус вакцинації у будь-якому віці. Пропущені щеплення необхідно негайно зробити повторно згідно з рекомендаціями для відповідного віку.

Рекомендації постійної комісії з вакцинації
(STIKO), 2026. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



у тижнях				у місяцях								у роках									
00	06	2	3	4	5-7	8-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-11	12-14	15-16	17	18-24	60-74	≥ 75
U2/U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J1		J2			

Моноклональні антитіла (одноразова доза) ^a				N														
	G1 ^b		G2	(G3)														
	G1	N	G2	N	G3 ^d	N			A1	N	A2	N	A ^g					
	G1	N	G2	N	G3 ^d	N			A1	N	A2	N	A ^g					
	G1	N	G2	N	G3 ^d	N			A1	N	A2	N	A3 ^g	N				
	G1	N	G2	N	G3 ^d	N												
	G1	N	G2	N	G3 ^d	N					A1		N					
	G1	N	G2	N	G3 ^d	N												
	G1	N	G2	N	G3 ^d	N			S ⁱ									
	G1	N	G2	N	G3 ^e		N											
					G1	N	G2	N					S ^h					
					G1	N	G2	N										
					G1	N	G2	N										
										G1 G2 ^{f f}		N						
											G1	N						
													G ^j	S ^j (щороку)				
															G1 G2 ^{k k}	N		
															S (щороку)			
																S ^l		

ПОЯСНЕННЯ

G

БАЗОВА ІМУНІЗАЦІЯ
(до 3-х часткових щеплень
G1 - G3)

S

СТАНДАРТНА ВАКЦИНАЦІЯ

A

РЕВАКЦИНАЦІЯ

N

ПОСЛІДУЮЧА ВАКЦИНАЦІЯ
(Базова імунізація всіх ще не вакцинованих або
Завершення неповної серії вакцинацій)

U

Скринінгове обстеження

J

Обстеження підлітків
(J1 у віці 12–14 років)



- a РСВ (моноклональні антитіла):** Народжені в період з квітня по вересень повинні отримати нірсевімаб восени, перед початком першого сезону РСВ; Новонароджені будь-якого гестаційного віку, що народилися в сезон РСВ (зазвичай з жовтня по березень), повинні отримати нірсевімаб у найкоротші терміни після народження, в ідеалі при виписці з пологового будинку або в період U2 (з 3 по 10 день життя).
- 1 Rota:** Перша доза вакцини з 6-тижневого віку, залежно від вакцини, 2-а чи 3-я доза вакцини з інтервалом не менш 4 тижнів.
- с TdaPHibIPV/НерВ/Рnc:** Недоношені діти: додаткова доза вакцини у віці 3 місяців, тобто лише 4 дози вакцини.
- d TdaPHibIPV/НерВ/Рnc:** Мінімальний інтервал від попередньої дози: 6 місяців.
- e MenB:** 3 дози у віці від 2 до 23 місяців; з 24 місяців серія вакцинацій складається з 2 доз.
- f HPV:** Дві дози вакцини з інтервалом не менше 5 місяців, з додатковою вакцинацією, починаючи від 15 років або з інтервалом між вакцинаціями менше 5 місяців між 1-ою та 2-ою дозами потрібна 3-я доза.
- g Td(ap):** Ревакцинація Td (проти правця й дифтерії) кожні 10 років. Наступна обов'язкова вакцинація Td - разова вакцинація як Tdap (проти правця, дифтерії, коклюшу) або, за наявності показань, комбінована вакцинація Tdap-IPV (проти правця, дифтерії, коклюшу й поліомієліту).
- h MMR:** Разова вакцинація вакциною MMR (проти кору, свинки, краснухи) для всіх осіб, що народилися після 1970 р. ≥ 18 років з неясним статусом щеплення, без щеплення або тільки з одним щепленням у дитинстві.
- i Рnc:** Рекомендується з РСВ20.
- 1 COVID-19:** Для захисту осіб без основного захворювання необхідні (принаймні) 3 контакти з антигеном, принаймні один з яких унаслідок вакцинації.
- k H. zoster:** Дворазова вакцинація ад'ювантною вакциною проти оперізувального герпесу (інактивованою вакциною) з інтервалом від 2 до 6 місяців.
- 1 РСВ (вакцинація):** Одноразова вакцинація білковою вакциною проти РСВ наприкінці літа/осені перед початком сезону РСВ.

* Вакцинацію можна робити в кілька прийомів. MMR (проти кору, свинки, краснухи) та V можна призначати на один день або з інтервалом у 4 тижні.

ТЕРМІНИ НАСТУПНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ

